

# 中华人民共和国农业部公告

第 2441 号

根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定,经审核,批准 DPT 实验室有限公司生产的醋酸曲普瑞林凝胶在我国注册,核发《进口兽药注册证书》,并发布产品质量标准、说明书和标签,自发布之日起执行。

批准硕腾公司美国卡拉玛祖生产厂等 2 家公司生产的盐酸头孢噻呋注射液等 6 个兽药产品在我国再注册,核发《进口兽药注册证书》,并发布修订后的产品质量标准、说明书和标签,自发布之日起执行。此前发布的同品种兽药质量标准、说明书和标签同时废止。

批准禧欧公司等 2 家公司生产的复方季铵盐戊二醛溶液等 4 个兽药产品在我国变更注册。

特此公告。

附件:1. 进口兽药注册目录

2. 质量标准

3. 说明书和标签

农 业 部

2016 年 8 月 25 日

## 附件 1

## 进口兽药注册目录

兽药名称	生产厂名称	国别	进口兽药注册证书号	有效期限	备注
醋酸曲普瑞林凝胶 Triptorelin A cetate Gel	DPT 实验室有限公司 DPT Laboratories, L td.	美国	(2016) 外兽药证 字 41 号	2016.08.25 - 2021.08.24	注册
盐酸头孢噻呋注射 液 (10m l:0.5g) Ceftiofur Hydrochloride Injection (10m l:0.5g)	硕腾公司美国卡拉玛祖生产厂 Zoetis LLC, Kalamazoo, USA	美国	(2016) 外兽药证 字 42 号	2016.08.25 - 2021.08.24	再注册
盐酸头孢噻呋注射 液 (100m l:5g) Ceftiofur Hydrochloride Injection (10m l:0.5g)			(2016) 外兽药证 字 43 号		
鸡传染性喉气管炎 活疫苗 (Serva 株) Infectious Laryngotracheitis Vaccine, Live (Strain Serva)	英特威国际有限公司 Intervet International B.V.	荷兰	(2016) 外兽药证 字 44 号	2016.08.25 - 2021.08.24	再注册
鸡传染性支气管炎 活疫苗 (M a5 株) Avian Infectious Bronchitis Vaccine, Live (Strain M a5)			(2016) 外兽药证 字 45 号		

鸡新城疫灭活疫苗 (C lone 30 株) New castle D isease Vaccine, Inactivated (Strain C lone 30)	英特威国际有限 公司 Intervet International B.V.	荷兰	(2016) 外兽药证 字 46 号	2016.08.25	再注册
鸡呼肠孤病毒活疫 苗 (1133 株) Avian Reovirus Vaccine, Live (Strain 1133)			(2016) 外兽药证 字 47 号	- 2021.08.24	
复方季铵盐戊二醛 溶液 Compound Quaternary Ammonium salts and Glutaral Solution	禧欧公司 THESEO	法国	(2015) 外兽药证 字 11 号	2015.03 - 2020.02	变更注册: 兽药商 品名称由“TH4+® ”变更为“喜洁宝 (TH4+®)”
土霉素注射液 (100m l:20g) Oxytetracycline Injection	拜耳动物保健公 司美国生产厂 Bayer HealthCare LLC, Bayer Animal Health Division	美国	(2015) 外兽药证 字 53 号	2015.11 - 2020.10	变更注册: 在说明 书和标签中增加 “【厂方代表】勃 林格殷格翰国际 贸易(上海)有限 公司北京分公司 地址: 北京市朝阳区 新源南路 3 号, 平安国际金融中 心 A 座 18 层 邮编: 100027 电话: 010-57653000 传真: 010-84864098”
土霉素注射液 (250m l:50g) Oxytetracycline Injection			(2015) 外兽药证 字 54 号	2015.11 - 2020.10	
土霉素注射液 (500m l:100g) Oxytetracycline Injection			(2015) 外兽药证 字 55 号	2015.11 - 2020.10	

## 附件 2（略）

## 附件 3

### 醋酸曲普瑞林凝胶等 6 种兽药产品说明书和标签

#### 一、醋酸曲普瑞林凝胶说明书和标签

##### （一）醋酸曲普瑞林凝胶说明书

**兽用**

##### 【兽药名称】

通用名称：醋酸曲普瑞林凝胶

商品名称：欧沃杰<sup>®</sup>（OvuGel<sup>®</sup>）

英文名称：Triptorelin Acetate Gel

汉语拼音：Cusuanqupuulin Ningjiao

##### 【主要成分】 醋酸曲普瑞林

【性状】 本品为稀薄透明至略显混浊的凝胶。

【药理作用】 激素类药。曲普瑞林为人工合成的性腺激素释放激素（GnRH）类似物，将天然 GnRH 第 6 位的甘氨酸以右旋色氨酸取代而成。GnRH 为一个在下丘脑神经元细胞体中合成并由其末梢分泌到垂体门脉循环的十肽，到达垂体前叶后，GnRH 刺激促性腺激素细胞释放促黄体激素（LH）和促卵泡激素（FSH）。LH 和 FSH 反过来又分别刺激性腺产生性类固醇和配子。为了发挥该作用，GnRH 与其表达在垂体促性腺细胞上的质膜结合型促性腺激素释放激素受体相互作用，该作用激活钙动员，并经 G 蛋白活化磷脂酶 C，随后蓄积的钙激活了介导促性腺激素释放的钙调素。

【适应证】 用于诱导断奶母猪群同步排卵，有助于促进单次、定时人工授精。

【用法与用量】 以本品计。母猪断奶后约 96 小时，单次经阴道给药 2ml（将施药器灌注管插入阴道距离子宫颈约 1~3 cm），给药后 20~24 小时内，对母猪进行人工授精。

【不良反应】 无

【注意事项】 1.本品使用前应于室温下至少放置 10 分钟。

2.本品应在回温后 1 小时内使用，未用完的药品应在使用后立即放入冰箱 2~8℃ 贮存。

3.瓶塞穿刺次数不得超过 3 次，首次穿刺后在 2~8℃ 条件下最长可贮存 28 天。

4.置于儿童无法接触的地方。

5.不得用于生殖道明显畸形的母猪；本品尚未批准用于后备母猪。

6.建议使用适配的连续施药器以确保给药剂量准确，每次给药时应更换施药器灌注管上的保护套。

7.建议根据精液供应商或人工授精器导管供应商的推荐，确保每次授精使用足够的精液并妥善保存精液。

8.授精期间宜有公猪在旁刺激。

【休药期】 母猪 0 日。

【规格】 52.5m l:5.25m g

【包装】

【贮藏】 2~8°C 保存

【有效期】 24 个月

【进口兽药注册证号】


【生产企业】 DPT 实验室有限公司 (DPT Laboratories, L td.)

地址: 307E . Josephine Street, San Antonio, Texas 78215, 美国

### 醋酸曲普瑞林凝胶的使用图示




1.取醋酸曲普瑞林凝胶瓶, 室温下放置最少 10 分钟。




2.取出施药器、灌注管和保护套备用。建议将连续施药器的给药剂量设定为 2m l。




3.在施药器上安装灌注管。




4.除去瓶口的铝箔封签, 将施药器倒置于直立的醋酸曲普瑞林凝胶瓶上, 将药瓶推入施药器接口。




5.充分压紧施药器的手柄后松开, 使施药器的腔室内充满药液。




6.倾斜施药器使灌注管朝上。




7. 压紧并松开施药器手柄，使得施药器腔室中的药液进入灌注管，同时药瓶中的药液再次充满施药器腔室。




8. 缓慢压紧并松开施药器手柄，将灌注管凝胶中的空气排出。此时灌注管和施药器腔室中应完全充满药液。




9. 将保护套套在灌注管外。



10. 轻柔缓慢地将带保护套的灌注管插入阴道，插入角度略朝上（避免插入尿道），直至遇到轻微的阻力（子宫颈），然后抽回约 1~3cm。



11. 压紧并松开施药器手柄一次，注入一个剂量单位的药液，同时另一个剂量单位的药液已再次充满施药器腔室。



12. 从阴道中撤出灌注管和保护套，将使用过的保护套丢弃并更换新的保护套。

每次给予醋酸曲普瑞林凝胶时重复步骤 9 到 12。

## （二）醋酸曲普瑞林凝胶标签

**兽用**

### 【兽药名称】

通用名称：醋酸曲普瑞林凝胶

商品名称：欧沃杰® (OvuGel®)

英文名称：Triptorelin Acetate Gel

汉语拼音：Cusuanqupu ruilin Ningjiao

### 【主要成分】 醋酸曲普瑞林

【性状】 本品为稀薄透明至略显混浊的凝胶。

【适应证】 用于诱导断奶母猪群同步排卵，有助于促进单次、定时人工授精。

【用法与用量】 以本品计。母猪断奶后约 96 小时，单次经阴道给药 2m l（将施药器灌注管插入阴道距离子宫颈约 1~3 cm），给药后 20~24 小时内，对母猪进行人工授精。

【规格】 52.5m l:5.25m g

【进口兽药注册证号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【休药期】 母猪0日

【贮藏】 2~8°C保存。

【包装】

【生产企业】 DPT 实验室有限公司（DPT Laboratories, L td.）

地址：307E . Josephine Street, San Antonio, Texas 78215, 美国

## 二、盐酸头孢噻呋注射液说明书和标签

### （一）盐酸头孢噻呋注射液说明书

**兽用**

【兽药名称】

通用名称：盐酸头孢噻呋注射液

商品名称：速解灵®无菌注射液（EXCENEL® RTU Sterile Suspension）

英文名称：Ceftiofur Hydrochloride Injection

汉语拼音：Yansuan toubaosaifu zhushey

【主要成分】 盐酸头孢噻呋

【性状】 本品为微细颗粒的混悬液，静置后微细颗粒下沉，振摇后成均匀的灰白色混悬液。

【药理作用】 药效学 头孢噻呋通过阻断细菌细胞壁的合成达到杀菌作用。头孢噻呋为广谱抗菌药，对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有较强的抗菌作用。

药动学 猪每 kg 体重颈部肌肉注射 5.0m g 头孢噻呋，药物的最高血浆浓度（ $C_{m\max}$ ）可达  $26.1 \pm 5.02\mu\text{g}/\text{mL}$ ，药一时曲线下面积  $AUC_{0-10\text{h}}$  为  $321 \pm 50.2\mu\text{g}\cdot\text{h}/\text{mL}$ ，达峰时间  $t_{m\max}$  为 0.66~2.0h，半衰期  $t_{1/2}$  为  $16.2 \pm 1.55\text{h}$ ，血浆浓度保持在  $0.2\mu\text{g}/\text{mL}$  的时间（ $t_{0.2}$ ）为  $93.8 \pm 7.98\text{h}$ 。

牛按 2.2m g 头孢噻呋/kg 体重的剂量给牛经颈部肌肉注射（IM）或皮下注射（SC），最高血浆浓度（ $C_{m\max}$ ）可达  $11.0 \pm 1.69\mu\text{g}/\text{mL}$  或  $8.56 \pm 1.89\mu\text{g}/\text{mL}$ ，药一时曲线下面积  $AUC_{0-10\text{h}}$  为  $160 \pm 30.7\mu\text{g}\cdot\text{h}/\text{mL}$  或  $95.4 \pm 17.8\mu\text{g}\cdot\text{h}/\text{mL}$ ，达峰时间  $t_{m\max}$  为 1~4h 或 1~5h，半衰期  $t_{1/2}$  为  $12.0 \pm 2.63\text{h}$  或  $11.5 \pm 2.57\text{h}$ ，血浆浓度保持在  $0.2\mu\text{g}/\text{mL}$  的时间（ $t_{0.2}$ ）为  $60.5 \pm 6.27\text{h}$  或  $51.0 \pm 6.53\text{h}$ 。



**【适应证】** 治疗由坏死性梭杆菌和产黑色素拟杆菌感染引起的奶牛腐蹄病；治疗猪细菌性呼吸道疾病。

**【用法与用量】** 以头孢噻呋计。牛，肌内或皮下注射：一次量，每 1kg 体重，1.1~2.2mg，一日 1 次，连用 3 日。猪，肌内注射：一次量，每 1kg 体重，3~5mg，一日 1 次，连用 3 日。

**【不良反应】**

1. 头孢噻呋毒性低，无致畸性、致癌性、遗传毒性和免疫毒性。但高度敏感动物会出现过敏反应。

2. 注射本品可出现短暂的临床可视或可触及的局部反应。

3. 注射部位的肌肉有可视变色，猪约持续 11 日，牛在颈部采用皮下注射或肌肉注射时，注射部位变色持续 11 日，牛后腿肌肉注射，变色可能持续 28 日。

**【注意事项】**

1. 仅在兽医指导下使用。

2. 每个注射位点的注射体积不超过 15 ml。

3. 使用前充分摇匀。

4. 不宜冷冻。

5. 置儿童无法触及处。

6. 有青霉素和头孢菌素类药物过敏史的工作人员禁止接触本品。

**【休药期】** 牛、猪 4 日；弃奶期 12 小时。

**【规格】** 以头孢噻呋计 (1) 10ml:0.5g (2) 100ml:5g

**【包装】** (1) 10ml/瓶 (2) 100ml/瓶

**【贮存】** 15~30℃ 密闭保存。

**【有效期】** 24 个月；首次开启后为 14 日。

**【进口兽药注册号】**

**【生产企业】** 硕腾公司美国卡拉玛祖生产厂 (Zoetis LLC, Kalamazoo, USA)

地址：2605E Kilgore Rd, Kalamazoo, MI USA

**【代理机构】** 硕腾（上海）企业管理有限公司

地址：上海市江苏路 398 号舜元企业发展大厦 15 层 邮编：200050

电话：(021) 2216 0288 传真：(021) 2216 0222

(二) 盐酸头孢噻呋注射液内标签

**兽用**

**【兽药名称】**

通用名称：盐酸头孢噻呋注射液

商品名称：速解灵®无菌注射液 (EXCENEL® RTU Sterile Suspension)

**【适应证】** 治疗由坏死性梭杆菌和产黑色素拟杆菌感染引起的奶牛腐蹄病；治疗猪细菌性呼吸道疾病。

**【用法与用量】** 以头孢噻呋计。牛，肌肉或皮下注射：一次量，每 1kg 体重，1.1~2.2mg，一日 1 次，连用 3 日。猪，肌肉注射：一次量，每 1kg 体重，3~5mg，一日 1 次，连用 3 日。

**【规格】** 以头孢噻呋计 （1）10m l:0.5g （2）100m l:5g

**【包装】** （1）10m l/瓶 （2）100m l/瓶

**【进口兽药注册号】**

**【生产批号】**

**【生产日期】**

**【有效期】** 至

**【生产企业】** 硕腾公司美国卡拉玛祖生产厂（Zoetis LLC，Kalamazoo，USA）

详情请参阅说明书。

## （二）盐酸头孢噻呋注射液外标签

**兽用**

**【兽药名称】**

通用名称：盐酸头孢噻呋注射液

商品名称：速解灵<sup>®</sup>无菌注射液（EXCENEL<sup>®</sup> RTU Sterile Suspension）

英文名称：Ceftiofur Hydrochloride Injection

汉语拼音：Yansuan toubaosai fu zhushuye

**【主要成分】** 盐酸头孢噻呋

**【适应证】** 治疗由坏死性梭杆菌和产黑色素拟杆菌感染引起的奶牛腐蹄病；治疗猪细菌性呼吸道疾病。

**【用法与用量】** 以头孢噻呋计。牛，肌肉或皮下注射：一次量，每 1kg 体重，1.1~2.2mg，一日 1 次，连用 3 日。猪，肌肉注射：一次量，每 1kg 体重，3~5mg，一日 1 次，连用 3 日。

**【注意事项】**

1. 仅在兽医指导下使用。
2. 每个注射位点的注射体积不超过 15ml。
3. 使用前充分摇匀。
4. 不宜冷冻。
5. 置儿童无法触及处。
6. 有青霉素和头孢菌素类药物过敏史的工作人员禁止接触本品。

【休药期】 牛、猪 4 日；弃奶期 12 小时。

【规格】 以头孢噻吩计 (1) 10m l:0.5g (2) 100m l:5g

【包装】 (1) 10m l/瓶 (2) 100m l/瓶

【贮存】 15~30℃ 密闭保存。

【进口兽药注册号】

【生产批号】

【生产日期】

【有效期】 至

【生产企业】 硕腾公司美国卡拉玛祖生产厂 (Zoetis LLC, Kalamazoo, USA)

地址: 2605E Kilgore Rd, Kalamazoo, MI USA

详情请参阅说明书。

### 三、鸡传染性喉气管炎活疫苗 (Serva 株) 说明书和标签

#### (一) 鸡传染性喉气管炎活疫苗 (Serva 株) 说明书

**兽用**

【兽药名称】

通用名 鸡传染性喉气管炎活疫苗 (Serva 株)

商品名 禽必威®喉炎净

英文名 Infectious Laryngotracheitis Vaccine, Live (Strain Serva)

汉语拼音 Ji Chuanranxing Houqiguanyan Huoyimiao (Serva Zhu)

【主要成分与含量】 疫苗含鸡传染性喉气管炎病毒 (Serva 株) 至少  $10^{2.5}$  EID<sub>50</sub>/羽份。

【性状】 白色或乳白色海绵状疏松团块, 易与瓶壁脱离, 加稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防鸡传染性喉气管炎。

【用法与用量】 点眼/滴鼻, 每只 1 羽份。接种的最佳时间和方法在很大程度上取决于当地的具体情况, 因此, 接种前应征求当地兽医的建议。

【不良反应】 接种后, 少数鸡可发生暂时性的轻微结膜炎。

【注意事项】 (1) 接种人员应注意自我保护, 如接触到疫苗, 应及时消毒。

(2) 仅用于接种健康鸡。

(3) 疫苗开启后应在 2 小时内用完。

(4) 接种后, 应对所用的用具和设备进行消毒,

(5) 疫苗瓶和未用完的疫苗液应焚烧或煮沸处理。

(6) 与其他呼吸道疾病疫苗的接种时间应间隔 14 日。

【规格】 (1) 1000 羽份/瓶 (2) 2500 羽份/瓶

【包装】 10 瓶/盒

【贮藏与有效期】 2~8℃ 保存, 有效期为 24 个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】 英特威国际有限公司 ( Intervet International B.V. )

地址: P.O. Box 31, 5830 AA Boxmeer, The Netherlands

电话: +31 (0) 485587600

**仅在兽医指导下使用**

(二) 鸡传染性喉气管炎活疫苗 ( Serva 株 ) 内包装标签

**兽用**

禽必威®喉炎净

鸡传染性喉气管炎活疫苗 ( Serva 株 )

1000 ( 2500 ) 羽份 / 瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】 用于预防鸡传染性喉气管炎。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为24个月。

【生产企业】 英特威国际有限公司

**仅在兽医指导下使用**

四、鸡传染性支气管炎活疫苗 ( Ma5 株 ) 说明书和标签

(一) 鸡传染性支气管炎活疫苗 ( Ma5 株 ) 说明书

**兽用**

【兽药名称】

通用名 鸡传染性支气管炎活疫苗 ( M a5 株 )

商品名 禽必威®艾必威

英文名 Avian Infectious Bronchitis Vaccine, Live ( Strain M a5 )

汉语拼音 Ji Chuanranxingzhiqiguanyan Huoyimiao ( M a5 Zhu )

【主要成分与含量】 含鸡传染性支气管炎病毒 ( M a5 株 ) 至少 $10^{3.5}$  EID<sub>50</sub>/羽份。

【性状】 白色或乳白色海绵状疏松团块, 易与瓶壁脱离, 加稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防鸡传染性支气管炎。

【用法与用量】 喷雾、滴眼 / 滴鼻或饮水接种。每只1 羽份。点眼 / 滴鼻接种时, 应用专用稀释液 ( 0.1N 水 ) 稀释疫苗。

接种的最佳时间和方法在很大程度上取决于当地的具体情况, 因此, 接种前应征求当地兽医的建议。

【不良反应】 一般无可见的不良反应。

**【注意事项】** (1) 接种人员应注意自我保护, 如接触到疫苗, 应及时消毒。

(2) 接种后, 应对所用的用具和设备进行消毒,

(3) 疫苗瓶和未用完的疫苗液应焚烧或煮沸处理。

(4) 仅用于接种健康鸡。

(5) 疫苗瓶开启后应立即使用。

**【规格】** (1) 500羽份/瓶 (2) 1000羽份/瓶 (3) 2000羽份/瓶 (4) 2500羽份/瓶 (5) 3000羽份/瓶 (6) 5000羽份/瓶 (7) 10000羽份/瓶

**【包装】** 10 瓶/盒

**【贮藏与有效期】** 2~8℃保存, 有效期为24个月。

**【《进口兽药注册证书》证号】**

**【生产企业】** 英特威国际有限公司 (Intervet International B.V.)

地址: P.O. Box31, 5830 AA Boxtmeer, The Netherlands

电话: +31 (0) 485587600

#### **仅在兽医指导下使用**

### (二) 鸡传染性支气管炎活疫苗 (Ma5 株) 内包装标签

**兽用**

禽必威®艾必威

鸡传染性支气管炎活疫苗 (Ma5 株)

500 (1000、2000、2500、3000、5000、10000) 羽份/瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

有效期至:

**【作用与用途】** 用于预防鸡传染性支气管炎。

**【贮藏与有效期】** 2~8℃保存, 有效期为24个月。

**【生产企业】** 英特威国际有限公司 (Intervet International B.V.)

#### **仅在兽医指导下使用**

## 五、鸡新城疫灭活疫苗 (Clone 30 株) 说明书和标签

### (一) 鸡新城疫灭活疫苗 (Clone 30 株) 说明书

**兽用**

**【兽药名称】**

通用名 鸡新城疫灭活疫苗 (Clone 30株)

商品名 禽必威®新加威

英文名 New castle Disease Vaccine, Inactivated (Strain Clone 30)

汉语拼音 Ji X inchengyi M iehuoyim iao (C lone 30 Zhu)

**【主要成分与含量】** 含灭活的鸡新城疫病毒(C lone 30 株)至少为50 PD<sub>50</sub>/羽份,或每1/50羽份疫苗至少能刺激产生2<sup>4.0</sup>H IU 抗体。

**【性状】** 乳白色乳剂。

**【作用与用途】** 用于预防鸡新城疫。

**【用法与用量】** 肌肉或颈下部皮下注射。种鸡和蛋鸡, 每只0.5m l; 肉鸡, 每只0.25m l。

接种的最佳时间和方法在很大程度上取决于当地的具体情况。因此, 接种前应征求当地兽医的意见。

**【不良反应】** 如按说明书正确接种健康鸡, 应无严重不良反应。但有时在接种部位出现微肿, 可持续数周, 若接种时严格执行无菌操作, 则不会造成永久性的组织损害。

**【注意事项】** (1) 疫苗切勿冻结。

(2) 仅用于接种健康鸡。

(3) 使用前应将疫苗放至室温(15~25℃), 并充分摇匀。

(4) 接种时, 应执行常规无菌操作。

(5) 疫苗瓶开启后, 应在3小时内用完。

(6) 本疫苗不得与其他疫苗混合使用。

(7) 如误将疫苗注入人体, 应立即就医, 并告诉医生本疫苗含有矿物油乳剂。

**【规格】** (1) 250m l/瓶 (2) 500m l/瓶

**【包装】** 12 瓶/盒

**【贮藏与有效期】** 2~8℃保存, 有效期为36个月。

**【《进口兽药注册证书》证号】**

**【生产企业】** 英特威国际有限公司 (INTERVET INTERNATIONAL B.V.)

地址: P.O Box31, 5830 AA Boxmeer, The Netherlands

电话: +31 (0) 485587600

### 仅在兽医指导下使用

(二) 鸡新城疫灭活疫苗 (Clone 30 株) 内包装标签

**兽用**

**禽必威®新加威**

**鸡新城疫灭活疫苗 (Clone 30株)**

250 (500) m l/瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

有效期至:

详见说明书。

**【作用与用途】** 用于预防鸡新城疫。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为36个月。

【生产企业】 英特威国际有限公司

**仅在兽医指导下使用**

**六、鸡呼肠孤病毒活疫苗（1133 株）说明书和标签**

**（一）鸡呼肠孤病毒活疫苗（1133 株）说明书**

**【兽药名称】**

**兽用**

通用名 鸡呼肠孤病毒活疫苗（1133 株）

商品名 禽必威®锐欧宝

英文名 Avian Reovirus Vaccine, Live (Strain 1133)

汉语拼音 Ji Huchanggubingdu Huoyimiao (1133 Zhu)

【主要成分与含量】 含鸡呼肠孤病毒1133 株，至少 $10^{3.1}$  TC ID<sub>50</sub>/羽份。

【性状】 白色至乳白色海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防由呼肠孤病毒引起的鸡腱鞘炎（病毒性关节炎）。

【用法与用量】 用于5日龄或5日龄以上鸡，颈背侧皮下注射，每只1羽份（0.2m l）。

接种的最佳时间在很大程度上取决于当地的具体情况。因此，接种前应征求当地兽医的意见。

【不良反应】 一般无可见的不良反应。

【注意事项】 （1）仅用于接种健康鸡。

（2）应尽量减少接种时和接种后的应激。

（3）配制后的疫苗应远离热源，并在数小时内用完。

（4）疫苗瓶开启后应一次用完。

（5）疫苗瓶和未用完的疫苗液应焚烧或煮沸处理。

（6）本疫苗不能与鸡马立克氏病活疫苗或传染性法氏囊病活疫苗混合使用。

【规格】 1000 羽份/瓶

【包装】 10 瓶/盒

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为24个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】 英特威国际有限公司（INTERVET INTERNATIONAL B.V.）

地址 P.O. Box31, 5830 AA Boxmeer, The Netherlands

电话 +31 (0) 0485587600

**仅在兽医指导下使用**

**（二）鸡呼肠孤病毒活疫苗（1133 株）内包装标签**

兽用

禽必威®锐欧宝

鸡呼肠孤病毒活疫苗（1133 株）

1000 羽份/瓶

《进口兽药注册证书》证号：

批 号：

有效期至：

详见说明书。

**【作用与用途】** 用于预防由呼肠孤病毒引起的鸡腱鞘炎（病毒性关节炎）。

**【贮藏与有效期】** 2~8℃保存，有效期为24个月。

**【生产企业】** 英特威国际有限公司

**仅在兽医指导下使用**