

# 中华人民共和国农业农村部公告

第 486 号

根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定,经审查,批准法国诗华动物保健公司等 2 家公司生产的托曲珠利内服混悬液等 2 种兽药产品在我国注册,核发《进口兽药注册证书》,并发布产品质量标准、说明书和标签,自发布之日起执行。

批准印度尼西亚美迪安有限公司等 3 家公司生产的鸡传染性鼻炎三价灭活疫苗等 5 种兽药产品在我国再注册,核发《进口兽药注册证书》,并发布修订后的产品质量标准、说明书和标签,自发布之日起执行。此前发布的该 5 种兽药产品质量标准、说明书和标签同时废止。

批准 TriRx 医药有限公司法国生产厂生产的氟苯尼考注射液等 2 种兽药产品在我国变更注册。

特此公告。

附件:1. 进口兽药注册目录

2. 质量标准

3. 说明书和标签

农业农村部

2021年11月9日

## 附件 1

## 进口兽药注册目录

兽药名称	生产厂名称	国别	进口兽药注册证书号	有效期限	备注
托曲珠利内服混悬液 (250ml : 12.5g) Toltrazuril Oral Suspension	法国诗华动物保健公司 CEVA SANTE ANIMALE S.A.	法国	(2021) 外兽药证字 65号	2021.11.09 — 2026.11.08	注册
托曲珠利内服混悬液 (1000ml : 50.0g) Toltrazuril Oral Suspension			(2021) 外兽药证字 66号		
猪圆环病毒 2 型、 猪肺炎支原体二联 灭活疫苗 (重组杆状病毒 P 株+P 株) Porcine Circovirus Type 2, Mycoplasma Hyopneumoniae Inactivated Vaccine (Recombinant Baculovirus Strain P + Strain P)	美国法玛威 生物制品股 份有限公司 Pharmgate Biologics Inc.	美国	(2021) 外兽药证字 67号	2021.11.09 — 2026.11.08	注册

鸡传染性鼻炎三价 灭活疫苗 Coryza Trivalent Vaccine, Inactivated	印度尼西亚 美迪安有限 公司 PT Medion Farma Jaya	印度尼 西亚	(2021) 外兽药证字 68号	2021.11.09 — 2026.11.08	再注册
鸡传染性喉气管炎 活疫苗 Infectious Laryngotracheitis Vaccine, Live	印度尼西亚 美迪安有限 公司 PT Medion Farma Jaya	印度尼 西亚	(2021) 外兽药证字 69号	2021.11.09 — 2026.11.08	再注册
鸡传染性喉气管炎 活疫苗 (Serva株) Infectious Laryngotracheitis Vaccine, Live (Strain Serva)	英特威国际 有限公司 Intervet International B.V.	荷兰	(2021) 外兽药证字 70号	2021.11.09 — 2026.11.08	再注册
鸡减蛋综合征灭活 疫苗 (BC14株) Avian Egg Drop Syndrome Vaccine, Inactivated (Strain BC14)	英特威国际 有限公司 Intervet International B.V.	荷兰	(2021) 外兽药证字 71号	2021.11.09 — 2026.11.08	再注册

<p>鸡传染性法氏囊病活疫苗 (M.B.株) Infectious Bursal Disease Vaccine, Live (Strain M.B.)</p>	<p>以色列雅贝克生物实验有限公司 ABIC Biological Laboratories Ltd.</p>	<p>以色列</p>	<p>(2021) 外兽药证字 72号</p>	<p>2021.11.09 — 2026.11.08</p>	<p>再注册</p>
<p>氟苯尼考注射液 Florfenicol Injection</p>	<p>TriRx 医药有限公司法国生产厂 TriRX Segre</p>	<p>法国</p>	<p>(2018) 外兽药证字 05号</p>	<p>2018.01.31 — 2023.01.30</p>	<p>变更注册：生产厂名称由先灵葆雅动物保健品公司法国生产厂 Schering - Plough Sante Animale, 变更为 TriRx 医药有限公司法国生产厂 TriRX Segre</p>
<p>氟尼辛葡甲胺注射液 Flunixin Meglumine Injection</p>	<p>TriRx 医药有限公司法国生产厂 TriRX Segre</p>	<p>法国</p>	<p>(2020) 外兽药证字 62号</p>	<p>2020.12.04 — 2025.12.03</p>	<p>变更注册：生产厂名称由先灵葆雅动物保健品公司法国生产厂 Schering - Plough Sante Animale, 变更为 TriRx 医药有限公司法国生产厂 TriRX Segre</p>

## 附件 2 略

## 附件 3

# 托曲珠利内服混悬液等 7 种兽药产品说明书和标签

## 一、托曲珠利内服混悬液说明书和标签

### (一) 托曲珠利内服混悬液说明书

兽用

#### 【兽药名称】

通用名称：托曲珠利内服混悬液

商品名称：诗球欣<sup>®</sup>5% (CEVAZURIL<sup>®</sup>5%)

英文名称：Toltrazuril Oral Suspension

汉语拼音：Tuoquzhuli Neifu Hunxuanye

#### 【主要成分】 托曲珠利

【性状】 本品为细微颗粒的混悬液，静置后细微颗粒下沉，振摇 30 秒内呈均匀的白色混悬液。

【药理作用】 **药效学** 抗球虫药。托曲珠利是三嗪酮衍生物，具抗等孢球虫属和艾美尔球虫属球虫的作用。托曲珠利作用于虫体的整个发育阶段：裂殖生殖期（无性繁殖阶段）和配子生殖期（有性繁殖阶段），直接杀灭虫体。

**药动学** 口服后吸收缓慢，生物利用度可达 70%。仔猪口服给药后约 24 小时血药浓度达最高值，浓度为 8.9mg/L。在动物体内消除缓慢，消除半衰期约为 76 小时。代谢产物为托曲珠利砒，主要经粪便排出。

【适应证】 用于预防由猪囊等孢球虫引起的仔猪球虫病。

【用法与用量】 以托曲珠利计。内服：一次量，每 1kg 体重，3~5 日龄仔猪 20mg（即每 1kg 体重 0.4ml）。

【不良反应】 按推荐剂量使用，未见不良反应。

【注意事项】 （1）对托曲珠利或辅料过敏的动物不得使用。

（2）本品使用前应充分摇匀。

（3）同窝仔猪建议同时全部给药，动物临床症状出现前即潜伏期进行治疗可达最佳效果。

（4）对因感染球虫已出现下痢的仔猪，应进行其他辅助性治疗。

（5）仔猪用药剂量较小，建议使用能够精确到 0.1ml 的给药设备。

（6）已知对托曲珠利或辅料过敏的人员应避免接触本品；如不慎溅到皮肤或眼睛，应立即用水冲洗；施用本品后请洗手。

【休药期】 猪 77 日。

【规格】 以 C<sub>18</sub>H<sub>14</sub>F<sub>3</sub>N<sub>3</sub>O<sub>4</sub>S 计（1）250ml：12.5g （2）1000ml：50.0g

【包装】

【贮藏】 密封保存。

【有效期】 24 个月。开启后 6 个月。

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 法国诗华动物保健公司 (CEVA SANTE ANIMALE S.A.)

地址 10 AVENUE DE LA BALLASTIERE, 33500 LIBOURNE, FRANCE

## (二) 托曲珠利内服混悬液标签

兽用

### 【兽药名称】

通用名称 托曲珠利内服混悬液  
商品名称 诗球欣<sup>®</sup>5% (CEVAZURIL<sup>®</sup>5%)  
英文名称 Toltrazuril Oral Suspension  
汉语拼音 Tuoquzhuli Neifu Hunxuanye

### 【主要成分】 托曲珠利

【性状】 本品为细微颗粒的混悬液，静置后细微颗粒下沉，振摇 30 秒内呈均匀的白色混悬液。

【适应证】 用于预防由猪囊等孢球虫引起的仔猪球虫病。

【用法与用量】 以托曲珠利计。内服：一次量，每 1kg 体重，3~5 日龄仔猪 20mg（即每 1kg 体重 0.4ml）。

【规格】 以 C<sub>18</sub>H<sub>14</sub>F<sub>3</sub>N<sub>3</sub>O<sub>4</sub>S 计 (1) 250ml : 12.5g (2) 1000ml : 50.0g

### 【进口兽药注册证号】

### 【生产日期】

### 【生产批号】

### 【有效期】 至

【休药期】 猪 77 日。

【贮藏】 密封保存。

### 【包装】

【生产企业】 法国诗华动物保健公司 (CEVA SANTE ANIMALE S.A.)

地址 10 AVENUE DE LA BALLASTIERE, 33500 LIBOURNE, FRANCE

## 二、猪圆环病毒 2 型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗（重组杆状病毒 P 株+P 株）说明书和内包装标签

### (一) 猪圆环病毒 2 型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗（重组杆状病毒 P 株+P 株）说明书

兽用

### 【兽药名称】

通用名 猪圆环病毒 2 型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗（重组杆状病毒 P 株+P 株）  
商品名 圆喘泰克  
英文名 Porcine Circovirus Type 2, Mycoplasma Hyopneumoniae Inactivated Vaccine (Recombinant Baculovirus Strain P + Strain P)

汉语拼音 Zhu Yuanhuan Bingdu Erxing、Zhu Feiyan Zhiyuanti Erlian Miehuoyimiao (Chongzu GanzhuangBingdu P Zhu + P Zhu)

【主要成分与含量】 含灭活的猪肺炎支原体 (P 株) 及由杆状病毒 (P 株) 表达的猪圆环病毒 2 型衣壳蛋白。每头份含猪肺炎支原体灭活抗原相对效力  $\geq 1.1$  和猪圆环病毒 2 型衣壳蛋白相对效力  $\geq 1.1$ 。

【性状】 本品为白色均匀混悬液。久置后底部可能有沉淀或分层现象，振摇后为白色均匀混悬液。

**【作用与用途】** 用于预防猪圆环病毒 2 型感染引起的疾病和预防猪支原体肺炎。

**【用法与用量】** 用于 10 日龄及以上猪，肌肉注射，每头 1 头份（1.0ml）。

**【不良反应】** 一般无可见的不良反应。如出现过敏反应，可用肾上腺素之类药物进行脱敏治疗。

**【注意事项】** （1）仅用于接种健康猪。

（2）疫苗切勿冻结或长时间暴露在高温环境。

（3）使用前充分摇匀，并将疫苗恢复室温。

（4）开瓶后，应一次用完。

（5）使用洁净注射器材。

（6）不可与其它疫苗混合使用。

（7）未用完的疫苗和使用后的疫苗瓶应销毁。

（8）屠宰前 21 日内禁止使用。

**【规格】** （1）10ml/瓶 （2）20ml/瓶 （3）50 ml/瓶 （4）100ml/瓶 （5）250ml/瓶 （6）500ml/瓶

**【包装】** （1）1 瓶/盒 （2）10 瓶/盒

**【贮藏与有效期】** 2℃~8℃保存，有效期为 24 个月。

**【《进口兽药注册证书》证号】**

**【生产企业】** 美国法玛威生物制品股份有限公司（Pharmgate Biologics Inc.）

地址 2635 University Ave W. Suite 140, St Paul, MN 55114 USA

**仅在兽医指导下使用**

（二）猪圆环病毒 2 型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗（重组杆状病毒 P 株+P 株）内包装标签

**兽用**

**猪圆环病毒 2 型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗（重组杆状病毒 P 株+P 株）  
圆喘泰克**

10（20、50、100、250、500）ml/瓶

《进口兽药注册证书》证号：

批 号：

生产日期：

**【作用与用途】** 用于预防猪圆环病毒 2 型感染引起的疾病和预防猪支原体肺炎。

**【用法与用量】** 用于 10 日龄及以上猪，肌肉注射，每头 1 头份（1.0ml）。

**【贮藏与有效期】** 2℃~8℃保存，有效期为 24 个月。

**【生产企业】** 美国法玛威生物制品股份有限公司 Pharmgate Biologics Inc.

地址 2635 University Ave W. Suite 140, St Paul, MN 55114 USA

**仅在兽医指导下使用**



### 三、鸡传染性鼻炎三价灭活疫苗说明书和内包装标签

#### (一) 鸡传染性鼻炎三价灭活疫苗说明书

兽用

##### 【兽药名称】

通用名 鸡传染性鼻炎三价灭活疫苗

商品名 无

英文名 Coryza Trivalent Vaccine, Inactivated

汉语拼音 Ji Chuanranxingbiyan Sanjia Miehuoyimiao

【主要成分与含量】 每羽份至少含灭活的副鸡嗜血杆菌 W 株 108.0CFU，灭活的副鸡嗜血杆菌 Spross 株 108.0CFU，灭活的副鸡嗜血杆菌 Modesto 株 108.0CFU。

【性状】 静置后，上层为灰白色澄明液体，下层为乳白色沉淀物，振摇后呈均匀混悬液。

【作用与用途】 用于预防鸡传染性鼻炎。

【用法与用量】 胸部、腿部肌肉注射或颈背部皮下注射，每只 0.5ml。

蛋鸡群和种鸡，建议 6~8 周龄接种。如果鸡场位于鸡传染性鼻炎流行区，建议在首次接种疫苗后 4~6 周或鸡群在 16~18 周龄时进行重复接种。

此程序为一般免疫程序，可根据各地区的特点制定合适的程序。

【不良反应】 一般无可见的不良反应。

【注意事项】 (1) 不要使用药瓶破裂或标签已损坏的疫苗。

(2) 只用于健康鸡的接种，因为病鸡不能产生良好的免疫效果。

(3) 接种时，避免阳光直接照射疫苗。

(4) 一旦开瓶，必须立即使用，并在 24 小时内用完。

(5) 免疫接种疫苗所用的注射器以及针头在使用前必须经煮沸 30 分钟（从水开始沸腾算起）进行消毒处理。在煮沸消毒前将注射器拆开。

(6) 免疫注射前，将疫苗瓶握于手掌中使疫苗温度回升至室温（24℃~27℃）至手感不凉时为止。免疫前及免疫过程中不断振摇疫苗。

(7) 免疫后，清洗手和设备。

(8) 如果疫苗偶然被注入人体，必须立即就医治疗。并告知医生注入体内的疫苗物质为氢氧化铝胶悬液。

(9) 用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】 (1) 100 羽份（50ml）/瓶 (2) 200 羽份（100ml）/瓶 (3) 500 羽份（250ml）/瓶 (4) 1000 羽份（500ml）/瓶

【包装】 1 瓶/盒

【贮藏与有效期】 2℃~8℃保存，有效期为 18 个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】 印度尼西亚美迪安有限公司（PT Medion Farma Jaya）

地址 JI Raya Batujajar No 29, Cimareme, Ngamprah, Kab. Bandung Barat, Indonesia

电话 0062 - 22 - 6030612

传真 0062 - 22 - 6010859 6015625

**仅在兽医指导下使用**

#### (二) 鸡传染性鼻炎三价灭活疫苗内包装标签

兽用

## 鸡传染性鼻炎三价灭活疫苗

100 (200、500、1000)

羽份/瓶《进口兽药注册证书》证号：

批 号：

生产日期：

【作用与用途】 用于预防鸡传染性鼻炎。

【用法与用量】 胸部、腿部肌肉注射或颈背部皮下注射，每只 0.5ml。

【贮藏与有效期】 2℃~8℃保存，有效期为 18 个月。

【生产企业】 印度尼西亚美迪安有限公司 (PT Medion Farma Jaya)

### 仅在兽医指导下使用

## 四、鸡传染性喉气管炎活疫苗说明书和内包装标签

### (一) 鸡传染性喉气管炎活疫苗说明书

兽用

#### 【兽药名称】

通用名 鸡传染性喉气管炎活疫苗

商品名 无

英文名 Infectious Laryngotracheitis Vaccine, Live

汉语拼音 Ji ChuanranxingHouqiguanyanHuoyimiao

【主要成分与含量】 每羽份含传染性喉气管炎病毒 A96 株至少为  $10^{2.7}$ EID<sub>50</sub>。

【性状】 淡黄色海棉状疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防鸡传染性喉气管炎。

【用法与用量】 点眼接种，用于肉鸡、公鸡、蛋鸡和种鸡的首免和加强免疫接种。将疫苗溶于适当的稀释液中，振摇直至充分混匀，避免起泡沫。每只鸡眼中滴一滴疫苗液。等到溶液完全进入眼中（鸡眨几次眼后）才松开。

推荐免疫程序（可根据各地区的特点制定合适的程序）：肉鸡或公鸡，2~3 周龄接种。蛋鸡或种鸡，在传染性喉气管炎低发区，10~16 周龄免疫，在传染性喉气管炎高发区，6~7 周龄接种，并在 16~17 周龄加强接种。

【不良反应】 用新城疫活疫苗或传染性支气管炎活疫苗进行接种 1~2 周后或在高浓度氨及多尘环境使用本品，会引起严重的反应。点眼接种后会引起炎症和结膜肿胀，这种反应可在 3~4 日内消失。

【注意事项】 (1) 不要使用药瓶破裂或标签已损坏的疫苗。

(2) 仅用于接种健康鸡，因为病鸡不能产生良好的免疫效果。

(3) 接种时，避免阳光直接照射疫苗。

(4) 一旦开瓶，必须立即使用，并在 2 小时内用完。

(5) 接种前 48 小时或接种后 24 小时，避免饲喂含消毒剂的水。

(6) 接种后清洗手和器械。疫苗瓶、包装和剩余的疫苗处理前必须烧毁、煮沸或浸泡在消毒剂溶液中 30 分钟后，才可扔掉。

(7) 接种本品后，为防止再次感染，服用广谱高效的抗生素防止上呼吸道炎症。

【规格】 (1) 500 羽份/瓶 (2) 1000 羽份/瓶

【包装】 10 瓶/盒

【贮藏与有效期】 2℃~8℃保存，有效期为 24 个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】 印度尼西亚美迪安有限公司（PT MedionFarma Jaya）

地址 Jl. Raya Batujajar No.29 Cimareme Ngamprah Kab. Bandung Barat, Indonesia

电话 0062 - 22 - 6030612 传真 0062 - 22 - 6010859 6015625

**仅在兽医指导下使用**

## （二）鸡传染性喉气管炎活疫苗内包装标签

兽用

### 鸡传染性喉气管炎活疫苗

500（1000）羽份/瓶

《进口兽药注册证书》证号：

批 号：

有效期至：

【作用与用途】 用于预防鸡传染性喉气管炎。

【用法与用量】 见使用说明书。

【贮藏与有效期】 2℃~8℃保存，有效期为24个月。

【生产企业】 印度尼西亚美迪安有限公司（PT MedionFarma Jaya）

**仅在兽医指导下使用**

## 五、鸡传染性喉气管炎活疫苗（Serva 株）说明书和内包装标签

### （一）鸡传染性喉气管炎活疫苗（Serva 株）说明书

兽用

#### 【兽药名称】

通用名 鸡传染性喉气管炎活疫苗（Serva株）

商品名 禽必威®喉炎净

英文名 Infectious Laryngotracheitis Vaccine, Live (Strain Serva)

汉语拼音 Ji Chuanranxing Houqiguanyan Huoyimiao (Serva Zhu)

【主要成分与含量】 疫苗含鸡传染性喉气管炎病毒（Serva株）至少 $10^{2.5}$ EID<sub>50</sub>/羽份。

【性状】 白色或乳白色海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防鸡传染性喉气管炎。

【用法与用量】 点眼/滴鼻，每只1羽份。接种的最佳时间和方法在很大程度上取决于当地的具体情况，因此，接种前应征求当地兽医的建议。

【不良反应】 接种后，少数鸡可发生暂时性的轻微结膜炎。

【注意事项】 （1）接种人员应注意自我保护，如接触到疫苗，应及时消毒。

（2）仅用于接种健康鸡。

（3）疫苗开启后应在2小时内用完。

（4）接种后，应对所用的用具和设备进行消毒，

（5）疫苗瓶和未用完的疫苗液应焚烧或煮沸处理。

（6）与其他呼吸道疾病疫苗的接种时间应间隔14日。

【规格】 （1）1000羽份/瓶 （2）2500羽份/瓶

【包装】 10 瓶/盒

【贮藏与有效期】 2℃~8℃保存，有效期为24个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】 英特威国际有限公司 (Intervet International B.V.)

地址 P.O.Box31, 5830 AA Boxmeer, The Netherlands

电话 +31 (0) 485587600

**仅在兽医指导下使用**

## (二) 鸡传染性喉气管炎活疫苗 (Serva 株) 内包装标签

兽用

禽必威®喉炎净

鸡传染性喉气管炎活疫苗 (Serva株)

1000 (2500) 羽份/瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】 用于预防鸡传染性喉气管炎。

【贮藏与有效期】 2℃~8℃保存, 有效期为24个月。

【生产企业】 英特威国际有限公司

**仅在兽医指导下使用**

## 六、鸡减蛋综合征灭活疫苗 (BC14 株) 说明书和内包装标签

### (一) 鸡减蛋综合征灭活疫苗 (BC14 株) 说明书

兽用

【兽药名称】

通用名 鸡减蛋综合征灭活疫苗 (BC14株)

商品名 禽必威®伊迪斯

英文名 Avian Egg Drop Syndrome Vaccine, Inactivated (Strain BC14)

汉语拼音 Ji Jiandanzonghezheng Miehuoyimiao (BC14 Zhu)

【主要成分与含量】 含灭活的鸡减蛋综合征病毒 (BC14 株), 每羽份至少刺激产生 $2^{7.0}$ HIU 抗体。

【性状】 乳白色乳剂。

【作用与用途】 用于预防鸡减蛋综合征。

【用法与用量】 用于蛋鸡和种鸡开产前接种, 肌肉或颈下部皮下注射, 每只0.5ml。

接种的最佳时间和方法在很大程度上取决于当地的具体情况。因此, 接种前应征求当地兽医的意见。

【不良反应】 如按说明书正确接种健康鸡, 应无严重不良反应。但有时在接种部位出现微肿, 可持续数周, 若接种时严格执行无菌操作, 则不会造成永久性的组织损害。

【注意事项】 (1) 疫苗切勿冻结。

(2) 仅用于接种健康鸡。

(3) 使用前应将疫苗放至室温 (15℃~25℃)。

(4) 接种前应摇匀。

(5) 应使用无菌注射器械进行接种。

(6) 疫苗瓶开启后应在3小时内用完。

(7) 本疫苗不得与其它疫苗混合使用。

(8) 如误将疫苗注入人体, 应立即就医, 并告诉医生本疫苗含有矿物油乳剂。

【规格】 1000 羽份 (500ml) /瓶

【包装】 12 瓶/盒

【贮藏与有效期】 2℃~8℃保存, 有效期为24个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】 英特威国际有限公司 (Intervet International B.V.)

地址 P.O.Box31, 5830 AA Boxmeer, The Netherlands 电话 +31 (0) 485587600

仅在兽医指导下使用

## (二) 鸡减蛋综合征灭活疫苗 (BC14 株) 苗内包装标签

禽必威®伊迪斯

鸡减蛋综合征灭活疫苗 (BC14株)

**兽用**

1000 羽份 (500ml) /瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

有效期至:

详见说明书。

【作用与用途】 用于预防鸡减蛋综合征。

【贮藏与有效期】 2℃~8℃保存, 有效期为24个月。

【生产企业】 英特威国际有限公司

仅在兽医指导下使用

## 七、鸡传染性法氏囊病活疫苗 (M.B.株) 说明书和内包装标签

### (一) 鸡传染性法氏囊病活疫苗 (M. B. 株) 说明书

**兽用**

【兽药名称】

通用名 鸡传染性法氏囊病活疫苗 (M.B.株)

商品名 无

英文名 Infectious Bursal Disease Vaccine, Live (Strain M.B.)

汉语拼音 Ji Chuanranxingfashinangbing Huoyimiao (M.B. Zhu)

【主要成分与含量】 含鸡传染性法氏囊病病毒 (M.B.株) 至少  $10^{2.5}$ EID<sub>50</sub>/羽份。

【性状】 淡粉色海绵状疏松团块, 易与瓶壁脱离, 加稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防鸡传染性法氏囊病。

【用法和用量】 饮水免疫, 适用于 10~12 日龄的鸡, 每只 1 羽份。

饮水免疫 每 1000 羽份的疫苗稀释到 10L 水中。溶解疫苗前, 可以在每升水中添加 50 ml 脱脂牛奶或 5g 的脱脂奶粉以保护病毒抗原。

【不良反应】 一般无可见的不良反应。

【注意事项】 (1) 疫苗仅用于健康、无应激的鸡群。

(2) 现用现配, 疫苗稀释后应立即接种, 限 2 小时内用完。

(3) 饮水接种前先给鸡群断水 2 小时, 使鸡群保持渴感。

(4) 接种前, 饮水中不能添加任何消毒剂, 饮水要清洁, 忌用金属容器。

(5) 用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行消毒处理。

【规格】(1) 1000羽份/瓶 (2) 2000羽份/瓶

【包装】 10 瓶/盒

【贮藏与有效期】 2℃~8℃保存，有效期为 18 个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】 以色列雅贝克生物实验有限公司 (ABIC Biological Laboratories Ltd.)

地址 3 Hamelacha St. West Industrial Zone, Beit - Shemesh 9905003, Israel

电话 (972) - 73 - 2373928

**仅在兽医指导下使用**

(二) 鸡传染性法氏囊病活疫苗 (M. B. 株) 内包装标签

兽用

鸡传染性法氏囊病活疫苗 (M.B.株)

1000 (2000) 羽份/瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

有效期至:

【用法和用量】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2℃~8℃保存，有效期为 18 个月。

【生产企业】 以色列雅贝克生物实验有限公司 (ABIC Biological Laboratories Ltd.)

**仅在兽医指导下使用**